Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ. 2313318356, -78
Α.Π.Θ. τηλ. 2310998323

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η
μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και Α.Π.Θ. / Τμήμα Βιολογίας - Τομέας Οικολογίας
Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της πόλης μας ως προς τα φυσικά αεροαλλεργιογόνα που προέρχονται από γύρη και σπόρια μυκήτων.

Δελτίο Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Σωματιδίων Βιολογικής Προέλευσης

Εβδομάδα: **15-21 Απριλίου 2019**

Φ υ τ ά

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία
Alnus spp.	σκλήθρο
Ambrosia spp.	αμβροσία
Artemisia spp.	αρτεμισία
Betula spp.	σημύδα
Carpinus spp.	γαύρος
Chenopodiaceae	Χηνοπόδια
Corylus spp.	φουντουκιά
Cupressaceae	Κυπαρισσοειδή
Oleaceae	ελιά & άλλα Ελαιοειδή
Pinaceae	πεύκα & έλατα
Plantago spp.	πεντάνευρο
Platanus spp.	πλατάνι
Poaceae	Αγρωστώδη
Populus spp.	λεύκη
Quercus spp.	βελανιδιά
Rumex spp.	λάπαθο
Ulmus spp.	φτελιά
Urticaceae	Κνιδοειδή (περδικάκι κ.ά.)

Στάθμη ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης γυρεοκόκκων (*)



Μ ύ κ η τ ε ς

Επιστημονική ονομασία
Alternaria spp.
Cladosporium spp.
Drechslera spp. (type)
Leptosphaeria spp.
Ustilago spp.

Στάθμη ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης σπορίων μυκήτων (*)



Μηδενική - Χαμηλή | **Μέτρια** | **Υψηλή**

(*) Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως "χαμηλή", "μέτρια" ή "υψηλή" η ατμοσφαιρική συγκέντρωση γυρεοκόκκων των επιμέρους φυτών και των σπορίων μυκήτων, λήφθηκαν υπόψη ιστορικά δεδομένα της κυκλοφορίας τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης συγκεντρώσεις τους και όρια που έχουν τεθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες. Τα όρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάβαση από τη μία στάθμη στην άλλη, με κανένα τρόπο δεν ισοδυναμούν με αντίστοιχα όρια κινδύνου εκδήλωσης συμπτωμάτων. Είναι μόνον ενδεικτικά της σχετικής αφθονίας γυρεοκόκκων και σπορίων μυκήτων στην ατμόσφαιρα και, κατ΄ επέκταση, της έκθεσης των ανθρώπων σε αυτούς.